



ગર્ભાશયના મુખ્યનું કેન્સર

કુંડારીયા કેન્સર પ્રિવેંશન ફાઉન્ડેશન
ડિવિઝન ઓફ રાજકોટ કેન્સર સોસાયટી



ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર શું છે?


- ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર એ ભારતીય મહિલાઓમાં જોવા મળતું બીજા નંબરનું કેન્સર છે.
- ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર એ નિયમિત અને સમયાંતરે તપાસથી અટકાવી શકાય તેવું કેન્સર છે.
- ભારતમાં સરેરાશ ૯૬,૯૨૨ ગર્ભાશયના મુખના કેન્સરના નવા કેસ નોંધાય છે.
- ગર્ભાશયના મુખના કેન્સરથી ભારતમાં ૬૦,૦૭૮ મૃત્યુ નોંધાય છે.

इलोपियन ट्यूम

मूत्राशय

ग्रीवा नलिका

योनि



अंडाशय

गर्भाशय

गर्भाशय ग्रीवा

मूत्राशय नलिका


गर्भाशय ग्रीवा अने तेनी आबुजाबुना अपयवो



ગર્ભશિયના મુખનું કેન્સર થવાના
જોખમો



THREE-DIMENSIONAL MODEL OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS



ગર્ભાશયના મુખનું એચપીવી
(હ્યુમન પેપીલોમા વાઇરસ) થી
ઇન્ફેક્શન

- એક થી વધારે વ્યક્તિઓ સાથે શારીરિક સંબંધ
- ૧૮ વર્ષ થી વહેલા શારીરિક સંબંધો રાખવા





૧૭ વર્ષથી નાની ઉમરમા માતા બનવું

વધારે બાળકો હોવા



ધુમ્રપાન



રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોવી

૫% વંશાનુગત





गर्भाशय ना मुष्नुं केन्सर थवाना लक्षणो



યોનિમાર્ગ માંથી વાસવાળું અથવા તો
પીળા કલર નું પ્રવાહી ઝરવું

- માસિક સાયકલપૂરી થઇ ગયા પછી પણ
માસિક સ્રાવ થવો
- શારીરિક સંબંધ દરમિયાન રક્તસ્રાવ થવો





પેડુ મા દુખાવો

પીઠ મા દુખાવો





વજન ઓછુ થવું

પગ મા સોજા, દુખાવો





गर्भाशय ना मुष्ना केन्सरथी केवीरीते ब्यथी शकाय

- प्राथमिक निवारण
- अन्य निवारण



પ્રાથમિક નિવારણ

પ્રાથમિક નિવારણ રોગને થતો અટકાવવા માટે ઉપયોગી છે.



એચપીવી વેક્સીન




- એચપીવી (હ્યુમન પેપીલોમા વાઇરસ) ની રસી અપાવવી
- એચપીવી વેક્સીન ૯ થી ૪૦ વર્ષ ના સમયગાળા મા લઇ શકાય
- ૯-૧૪ વર્ષ ની ઉમર વચ્ચે ૨ ડોઝ આપવામાં આવે છે.
- ૧૪-૪૦ વર્ષ ની ઉમર વચ્ચે ૩ ડોઝ આપવામાં આવે છે



એયપીવીએ જાતીય સંબંધ દ્વારા ફેલાતો વાઇરસ છે. જાતીય રીતે સક્રિય દરેક વ્યક્તિને જીવનમાં કોઈક સમયે ૨૦૦ માંથી કોઈ પણ પ્રકારના એયપીવી વાઇરસનું ઇન્ફેક્શન લાગવાની શક્યતા છે. મોટા ભાગના એયપીવીના ઇન્ફેક્શન જાતે જ ઠીક જાય છે, પણ જો ઇન્ફેક્શન રહી જાય તો કેન્સર થવાનું જોખમ રહે છે.

જાતીય રીતે સક્રિય થતા પહેલા આ રસી અપાવવી જરૂરી છે.





એચપીવી નું ઇન્ફેક્શન ઘટાડવા
કોન્ડોમનો ઉપયોગ કરો

- સુરક્ષિત શારીરિક સંબંધ
- એક કરતા વધારે સાથે સંબંધ ટાળો






અન્ય નિવારણ

- અન્ય નિવારણનો હેતુ તપાસની મદદથી રોગને પ્રારંભિક તબક્કામાં પકડી અને તેને વધતો અટકાવવાનો છે.
- તંદુરસ્ત દેખાતી મહિલાઓમાં ગર્ભાશયના મુખના ફેરફારો કે જે ભવિષ્યમાં કેન્સર માં પરિણામી શકે તેનું નિદાન કરવા માટે સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે.
- દા.ત. પેપ ટેસ્ટ



पेप स्मीयर टेस्ट







પેપ સ્મીયર ટેસ્ટ શું છે

- પેપ સ્મીયર ટેસ્ટ એ ગર્ભાશયના કોષોની તપાસ માટેની એક પ્રક્રિયા છે જેમાં સ્ત્રી ના યોનિમાર્ગ ની ભીનાશ ને એક લાકડાની ચમચી જેવા સાધનથી કલેક્ટ કરી લેબોરેટરી મા તપાસ માટે મોકલવામાં આવે છે.
- ૩૦ વર્ષથી મોટી મહિલાઓ એ દર ૩ વર્ષે પેપ ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ
- ૨૧ વર્ષથી નાની તથા ૬૫ વર્ષથી મોટી મહિલાઓએ પેપ ટેસ્ટ કરાવવની જરૂર નથી
- ગર્ભાશયનું ઓપેરશન કરાવેલી મહિલાઓને પેપ ટેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી



SCREENING
SAVES LIVES



સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ શું છે?

- સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ એ સામાન્ય વ્યક્તિ, જેમાં કેન્સરના લક્ષણો કે ચિહ્નો દેખાતા નથી, તેમાં વહેલા નિદાન માટે કરવામાં આવતા ટેસ્ટ છે.
- સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટથી કેન્સરને થતું અટકાવી શકાતું નથી, પણ કેન્સર પહેલા તબીબકામાં પકડી શકાય છે જેથી તે જીવન માટે જોખમી બને તે પહેલા સારવાર કરી શકાય.





- સ્તનના કેન્સરનો સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ શું છે?
- ગર્ભાશયના મુખના કેન્સરનો સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ શું છે?
- એચપીવીની રસી શું છે?



ଆମିର